

## MATHÉMATIQUES (options scientifique, économique, technologique et littéraire B/L)

### 1. Procédure d'interrogation

Le mode d'interrogation reste identique à celui des concours précédents et rappelons brièvement que le sujet proposé aux candidats (quelle que soit l'option dont ils sont issus) comprend deux parties:

- un exercice principal préparé pendant 30 minutes et portant sur l'une des trois parties suivantes du programme: algèbre, probabilités et analyse. De plus, une question de cours en rapport avec le thème de l'exercice fait partie de l'exercice principal ;
- un exercice sans préparation portant sur une partie différente de celle de l'exercice principal, permettant de tester en temps réel les qualités de réactivité des candidats.

Rappelons que dans tous les cas, chaque candidat est interrogé en probabilités, soit au titre de l'exercice principal (20 à 25 minutes), soit à celui de l'exercice sans préparation (5 à 10 minutes).

### 2. Résultats statistiques

Par option, les notes moyennes obtenues sont les suivantes:

- option scientifique (426 candidats): 11,35 (11,15 en 2013)
- option économique (187 candidats): 10,42 (9,62 en 2013);
- option technologique (26 candidats): 10,73 (10,18 en 2013);
- option littéraire B/L (17 candidats): 11,06 (11,71 en 2013).

### 3. Commentaires

A l'issue des épreuves orales de mathématiques, on peut tirer un certain nombre d'enseignements.

Tout d'abord, les rapports de jury des concours précédents ainsi que les échanges dans la commission de mathématiques lors de la journée des classes préparatoires, sont manifestement répercutés auprès des admissibles : ainsi, les prestations d'une majorité de candidats sont essentiellement orales et le tableau n'est utilisé que comme support de l'exposé.

Ensuite, la « règle du jeu » est assez bien respectée : les candidats passent les questions non traitées ou inachevées et poursuivent l'exposé.

La question courte en fin d'interrogation joue son rôle d'amortisseur ou d'amplificateur de la note de l'exercice principal.

Cette année, le jury a observé moins de mauvaises prestations de la part des candidats de l'option économique (les notes inférieures à 5 sont moins fréquentes que lors des concours passés). Parallèlement, on assiste à un recul du nombre de candidats exceptionnels dans l'option scientifique. La conjonction de ces phénomènes explique en partie la réduction de l'écart de moyenne entre les candidats de ces deux options par rapport au concours 2013 : 1,5 point en 2013 et un peu moins d'un point en 2014.

#### Option scientifique

Le niveau général est bon, en légère hausse par rapport à celui du concours 2013 : les notes s'étendent entre 3 et 20 et l'écart-type de 3,59 permet de classer correctement les admissibles.

Il y a quelques candidats excellents dont les exposés très clairs, concis et exhaustifs s'appuient sur une argumentation pertinente qui leur permet de prouver les résultats attendus.

Cette année encore, le « principe des vases communicants » a privilégié l'algèbre linéaire et bilinéaire au détriment de l'analyse (suites, fonctions réelles, calcul différentiel et intégral).

L'ensemble des examinateurs a constaté que l'abstraction des sujets d'algèbre n'est pas un handicap insurmontable comme ce fut le cas durant de nombreuses années : les exposés sont clairs et argumentés rigoureusement.

En revanche, une majorité de candidats éprouvent de grandes difficultés à résoudre les sujets d'analyse « pure », même les plus simples. Les notions les plus élémentaires - étude de fonctions, représentations graphiques, convexité et concavité, théorèmes classiques (accroissements finis, valeurs intermédiaires, etc.) – ne sont pas du tout maîtrisées.

Notons également un niveau de connaissances très insuffisant en trigonométrie et assez stable en probabilités.

#### Option économique

Le décrochage du niveau des candidats de cette option par rapport à ceux de l'option scientifique observé depuis quelques années a connu un coup d'arrêt cette année : les notes s'étendent entre 4 et 18 et l'écart-type de 3,66 est suffisamment élevé pour classer les candidats de cette option.

Malgré tout, les observations relevées en 2012 et 2013 restent d'actualité en ce qui concerne les points négatifs.

Les concepts fondamentaux sont mieux maîtrisés et les confusions (fonction de répartition et densité, « dimension » d'une application linéaire) sont plus rares, le cours est manifestement mieux assimilé même si les explications utilisent un langage mathématique très approximatif qui nuit à la rigueur de l'exposé, (par exemple, la définition de la convergence d'une intégrale généralisée ou encore, la mauvaise utilisation, voire l'ignorance de la présence de quantificateurs dans un sujet), les techniques de calculs élémentaires font souvent défaut et les confusions entre condition nécessaire et condition suffisante restent trop fréquentes.

#### Option technologique

Les niveaux des candidats (26 admissibles) sont très contrastés avec une moyenne supérieure à celle du concours 2013 et un écart-type plus élevé (4,53 cette année contre 4,35 en 2013).

Globalement, les notes s'étalent entre 4 et 20.

#### Option littéraire B/L

Sur les 17 candidats admissibles présents, la moyenne est de 11,06, en recul par rapport à celle du concours 2013 et s'accompagne d'un écart-type très élevé de 4,74 reflétant une population de candidats très hétérogène.

#### 4. Remarques

Le jury a observé chez nombre de candidats un certain formatage et il recommande aux futurs candidats d'éviter de réciter à l'oral des recettes qu'ils ne maîtrisent pas : même si elles peuvent parfois faire illusion dans un problème d'écrit où la part d'initiative personnelle est réduite, ces phrases ou ces formules apprises par cœur et qui tiennent lieu de « prêt à penser », passent difficilement le filtre de l'épreuve orale.

Rappelons enfin que les sujets de mathématiques du prochain concours se baseront, pour les options E et S, sur le nouveau programme de mathématiques et informatique des classes préparatoires économiques et commerciales.

Les sujets suivants, posés aux candidats des options scientifique, économique, technologique et littéraire B/L, constituent un échantillon des sujets proposés lors des épreuves orales du concours 2014.

## 1. SUJETS DE L'OPTION SCIENTIFIQUE

### Exercice principal S 49

Les variables aléatoires qui interviennent dans cet exercice sont définies sur un espace probabilisé  $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ .

- Question de cours : Définition de la convergence en probabilité d'une suite de variables aléatoires.
- Dans cette question, on note  $Z$  une variable aléatoire suivant la loi normale centrée réduite et  $\Phi$  la fonction de répartition de  $Z$ .  
Pour tout réel  $\theta$ , on note  $P_\theta$  la loi de la variable aléatoire  $Y_\theta = (Z + \theta)^2$ .
  - Exprimer la fonction de répartition de  $Y_\theta$  à l'aide de  $\Phi$ .
  - La variable aléatoire  $Y_\theta$  possède-t-elle une densité ?
  - Reconnaître la loi  $P_\theta$ .
  - Montrer que pour tout réel  $\theta \geq 0$ , les lois  $P_\theta$  et  $P_{-\theta}$  sont identiques.
- a) Soit  $X$  une variable aléatoire à valeurs positives ou nulles. Établir pour tout couple  $(a, b) \in \mathbb{R}_+^2$ , l'inégalité :

$$P(|\sqrt{X} - a| \geq b) \leq P(|X - a^2| \geq ab)$$

- Soit  $(T_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  une suite convergente d'estimateurs d'un paramètre positif inconnu  $\theta$ , ne prenant tous que des valeurs positives ou nulles.  
Dédire de la question précédente que  $(\sqrt{T_n})_{n \in \mathbb{N}^*}$  est une suite convergente d'estimateurs du paramètre  $\sqrt{\theta}$ .
- Dans cette question,  $\theta$  désigne un paramètre positif inconnu et  $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  une suite de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées, de loi commune  $P_\theta$  définie dans la question 2.
  - Trouver une suite convergente d'estimateurs sans biais  $(T_n)_{n \in \mathbb{N}^*} = (\varphi_n(X_1, \dots, X_n))_{n \in \mathbb{N}^*}$  du paramètre  $\theta^2$ .
  - En déduire une suite convergente d'estimateurs du paramètre  $\theta$ . Sont-ils sans biais ?

### Exercice sans préparation S 49

- Montrer que la matrice  $M = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & a & b \\ 0 & c & d \end{pmatrix}$  de  $M_3(\mathbb{R})$  est diagonalisable si et seulement si la matrice  $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$  de  $M_2(\mathbb{R})$  est diagonalisable.
- Soit  $f$  un endomorphisme diagonalisable d'un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel  $E$  de dimension 3 et soit  $D$  une droite vectorielle de  $E$  stable par  $f$ .
  - Montrer que  $D$  admet un supplémentaire stable par  $f$ .
  - Montrer que si  $P$  est un supplémentaire de  $D$  stable par  $f$ , la restriction de  $f$  à  $P$  définit un endomorphisme diagonalisable de  $P$ .

### Exercice principal S 50

1. Question de cours : Formule du binôme négatif.

2. Soit  $p \in ]0, 1[$ . Pour tout couple  $(n, k) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}$ , on note  $p_{n,k}$  la probabilité qu'une variable aléatoire suivant la loi binomiale  $\mathcal{B}(n, p)$  soit égale à  $k$ .

Calculer  $\sum_{n=1}^{+\infty} p_{n,0}$  et montrer que pour tout  $k \in \mathbb{N}^*$ , on a :  $\sum_{n=1}^{+\infty} p_{n,k} = \frac{1}{p}$ .

Soit  $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  une suite de variables aléatoires à valeurs dans  $\mathbb{N}$  définies sur le même espace probabilisé  $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ , mutuellement indépendantes et de même loi.

On pose :  $S_0 = 0$ , et pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$ . Pour tout  $(a, n) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{N}$ , on pose :  $F_n(a) = P[S_n \leq a]$ .

3. Soit  $a > 0$ . On note  $N(a) = \text{Card}\{n \in \mathbb{N} ; S_n \leq a\}$  (pour tout  $\omega \in \Omega$ ,  $N_a(\omega)$  est le nombre, éventuellement égal à  $+\infty$ , des entiers  $n$  pour lesquels  $S_n(\omega) \leq a$ ).

a) Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . Montrer que  $[N(a) = n] \in \mathcal{A}$  et que  $P[N(a) = n] = F_{n-1}(a) - F_n(a)$ .

b) Exprimer l'événement  $[N(a) < \infty]$  en fonction des événements  $([N(a) = n])_{n \in \mathbb{N}^*}$  et en déduire que  $[N(a) < \infty] \in \mathcal{A}$ .

c) Montrer que la suite  $(F_n(a))_{n \in \mathbb{N}}$  admet une limite finie et que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} F_n(a) = 0$  si et seulement si  $P[N(a) < \infty] = 1$ .

d) On suppose dans cette question que la série de terme général  $F_n(a)$  est convergente.

Montrer que la variable aléatoire  $N(a)$  admet une espérance et que  $E(N(a)) = \sum_{n=0}^{+\infty} F_n(a)$ .

4. Soit  $p$  et  $q$  deux réels vérifiant  $0 < q < p < 1$ . Dans cette question, on suppose que pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ , on a  $P(X_n = 0) = 1 - p$  et  $P(X_n = 1) = q$ .

En utilisant les questions précédentes et en considérant les variables aléatoires  $Y_n = \begin{cases} 0 & \text{si } X_n = 0 \\ 1 & \text{si } X_n \geq 1 \end{cases}$ , montrer

que pour tout  $a > 0$ , on a :  $E(N(a)) \leq \frac{[a] + 1}{p}$ .

### Exercice sans préparation S 50

Soit  $E$  un espace euclidien de dimension  $n \geq 2$ ; on note  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  le produit scalaire et  $\| \cdot \|$  la norme associée.

1. Soit  $x \in E$ . Montrer que  $\|x\| = \sqrt{n}$  si et seulement si il existe une base orthonormale  $\mathcal{B} = (e_1, e_2, \dots, e_n) \in E$  vérifiant  $x = \sum_{k=1}^n e_k$ .

2. Soit  $x$  et  $y$  deux vecteurs de  $E$ . Trouver une condition nécessaire et suffisante pour qu'il existe une base orthonormale  $\mathcal{B} = (e_1, e_2, \dots, e_n) \in E$  vérifiant  $x = \sum_{k=1}^n e_k$  et  $y = \sum_{k=1}^n k e_k$ .

**Exercice principal S 56**

Dans tout l'exercice,  $n$  est un entier supérieur ou égal à 2.

1. Question de cours : Soit  $h$  une fonction numérique de classe  $C^1$  sur un ouvert  $\Omega$  de  $\mathbb{R}^n$ .

a) Qu'appelle-t-on point critique de  $h$  ?

b) Qu'appelle-t-on point critique pour l'optimisation de  $h$  sous contraintes d'égalités linéaires

$$C \begin{cases} g_1(X) = b_1 \\ \dots \\ g_p(X) = b_p \end{cases}$$

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}^n$  par :  $f(u_1, \dots, u_n) = \sum_{i=1}^n u_i^2$ .

2. Soit  $x_1, \dots, x_n$  des réels donnés non tous égaux, de moyenne  $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$ .

On pose :  $s^2 = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (x_j - \bar{x})^2$ , et pour tout  $i \in [1, n]$  :  $\alpha_i = \frac{x_i - \bar{x}}{ns^2}$ .

a) Montrer que  $s^2$  est strictement positif.

b) Exprimer en fonction de  $s^2$ , le minimum global de la fonction  $\phi : t \mapsto f(x_1 - t, \dots, x_n - t)$ .

c) Soit  $\rho$  et  $\theta$  deux réels donnés.

Montrer qu'il n'existe qu'un seul point critique  $u^* = (u_1^*, \dots, u_n^*)$  pour l'optimisation de  $f$  sous les contraintes

$$\sum_{i=1}^n u_i = \rho \text{ et } \sum_{i=1}^n x_i u_i = \theta, \text{ donné par : } \forall i \in [1, n], u_i^* = \frac{\rho}{n} + (\theta - \rho \bar{x}) \alpha_i.$$

3. Soit  $n$  variables aléatoires  $Y_1, \dots, Y_n$  discrètes, mutuellement indépendantes, admettant des moments d'ordre 1 et 2 telles que, pour tout  $i \in [1, n]$ ,  $E(Y_i) = ax_i + b$  et  $V(Y_i) = 1$ , où  $a$  et  $b$  sont des paramètres réels.

On considère les variables aléatoires de la forme  $A_n^{(r)} = \sum_{i=1}^n r_i Y_i$ , où  $(r_i)_{1 \leq i \leq n}$  est un élément de  $\mathbb{R}^n$  indépendant de  $a$  et de  $b$  (mais qui peut dépendre de  $x_1, \dots, x_n$ ).

a) Trouver, parmi les variables aléatoires  $A_n^{(r)}$  qui vérifient pour tout  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ ,  $E(A_n^{(r)}) = a$ , celles qui ont la plus petite variance.

Proposer une interprétation de ce résultat en terme d'estimation du paramètre  $a$ .

b) Énoncer et démontrer un résultat similaire pour le paramètre  $b$ .

**Exercice sans préparation S 56**

Soit  $f$  l'endomorphisme de  $\mathbb{R}^3$  dont la matrice dans la base canonique  $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$  est  $M = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & -2 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ .

1. Montrer que  $f - \text{id}_{\mathbb{R}^3}$  est un projecteur.

2. Quelles sont les valeurs propres de  $f$  ?

3. Combien existe-t-il de droites vectorielles de  $\mathbb{R}^3$  stables par  $f$  ?

4. Combien existe-t-il de plans vectoriels de  $\mathbb{R}^3$  stables par  $f$  ?

### Exercice principal S 61

1. Question de cours : Densité de la somme de deux variables aléatoires à densité indépendantes.
2. Soit  $U$  et  $V$  deux variables aléatoires définies sur un même espace probabilisé  $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ , indépendantes et suivant la loi uniforme sur le segment  $[0, 1]$ .

Déterminer une densité  $g$  de  $U + V$ . Donner l'allure du graphe de  $g$ .

On note  $\mathcal{E}$  l'espace vectoriel réel des fonctions continues sur  $\mathbb{R}$ .

Pour tout élément  $f \in \mathcal{E}$ , on note  $T(f)$  l'application de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  définie par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, T(f)(x) = \int_{x-\frac{1}{2}}^{x+\frac{1}{2}} f(t) dt.$$

3. Montrer que l'application  $T$  qui, à tout  $f \in \mathcal{E}$  associe  $T(f)$ , est un endomorphisme de  $\mathcal{E}$ .
4. Montrer que si un élément  $f \in \mathcal{E}$  est une densité de probabilité, alors  $T(f)$  est également une densité de probabilité.
5. Soit  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $\mathbb{R}_n[X]$  l'espace vectoriel des polynômes à coefficients réels de degré inférieur ou égal à  $n$ , identifiés à des fonctions polynômes.
  - a) Montrer que la restriction de  $T$  à  $\mathbb{R}_n[X]$  définit un endomorphisme  $T_n$  de  $\mathbb{R}_n[X]$ .
  - b) L'endomorphisme  $T_n$  est-il bijectif? Est-il diagonalisable?
6. L'endomorphisme  $T$  est-il injectif? Est-il surjectif?

### Exercice sans préparation S 61

Pour tout entier  $n \geq 1$ , on pose :  $u_n = \ln n + a \ln(n+1) + b \ln(n+2)$ .

1. Déterminer les réels  $a$  et  $b$  pour que la série de terme général  $u_n$  soit convergente.
2. Calculer alors la somme de cette série.

### Exercice principal S 75

1. Question de cours : Théorème de d'Alembert-Gauss. Application à la factorisation de polynômes dans  $\mathbb{R}[X]$  et dans  $\mathbb{C}[X]$ .

2. Soit  $a, b$  et  $c$  des réels et  $T$  le trinôme  $T(X) = aX^2 + bX + c$ . On note  $T'$  et  $T''$  respectivement, les dérivées première et seconde de la fonction  $T$ .

a) Donner une condition nécessaire et suffisante portant sur les réels  $a, b$  et  $c$  pour que, pour tout  $x \in \mathbb{R}$ , on ait :  $T(x) \geq 0$ .

b) On suppose que  $T$  possède deux racines réelles distinctes. Dédurre de la question précédente que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, T(x)T''(x) \leq (T'(x))^2.$$

Dans la suite de l'exercice, on note  $n$  un entier supérieur ou égal à 2 et  $P$  un polynôme de  $\mathbb{R}[X]$  de degré  $n$  ayant  $n$  racines réelles distinctes.

On pose :  $P(X) = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ . On note  $P'$  et  $P''$  respectivement, les dérivées première et seconde de  $P$ .

3. Montrer que  $P'$  possède  $(n-1)$  racines réelles distinctes.

4.a) Montrer que la fonction  $x \mapsto \frac{P'(x)}{P(x)}$  est décroissante sur chaque intervalle de son ensemble de définition.

b) En déduire que pour tout  $x \in \mathbb{R}$ , on a :  $P(x)P''(x) \leq (P'(x))^2$ .

5. À l'aide des questions précédentes, établir pour tout  $k \in [0, n-2]$ , l'inégalité :  $a_k a_{k+2} \leq a_{k+1}^2$ .

### Exercice sans préparation S 75

Soit  $X$  et  $Y$  deux variables aléatoires définies sur un espace probabilisé  $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ , à valeurs dans  $\mathbb{N}$  telles que :

$$\forall (i, j) \in \mathbb{N}^2, P([X = i] \cap [Y = j]) = \frac{a}{(i+j+1)!}.$$

Déterminer le réel  $a$ . Les variables aléatoires  $X$  et  $Y$  sont-elles indépendantes ?

### Exercice principal S 91

1. Question de cours : Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . On rappelle que  $\mathbb{R}_n[T]$  est l'ensemble des polynômes à coefficients réels de degré inférieur ou égal à  $n$ . Que peut-on dire d'un polynôme de  $\mathbb{R}_n[T]$  qui admet plus de  $n$  racines ?

2. On confond vecteur de  $\mathbb{R}^n$  et matrice-colonne de  $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ . Soit  $x_1, x_2, \dots, x_n$ ,  $n$  réels tous distincts.

On considère la matrice  $A = \begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_{n-1} & x_{n-1}^2 & \cdots & x_{n-1}^{n-1} \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-1} \end{pmatrix}$ . Soit  $U = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}$  un vecteur de  $\mathbb{R}^n$  tel que  $AU = 0$ .

a) Montrer que le polynôme  $Q(T) = \sum_{j=1}^n \alpha_j T^{j-1}$  est nul.

b) En déduire que la matrice  $A$  est inversible.

3. Dans cette question,  $X$  et  $Y$  sont deux variables aléatoires définies sur un espace probabilisé  $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ , suivant des lois de Bernoulli de paramètres respectifs  $p$  et  $p'$  ( $0 < p < 1$  et  $0 < p' < 1$ ) et telles que la covariance de  $X$  et  $Y$  est nulle.

Montrer que  $X$  et  $Y$  sont indépendantes.

4. Soit  $(X, Y)$  un couple de variables aléatoires réelles discrètes finies définies sur  $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ , et soit  $n$  et  $m$  deux entiers supérieurs ou égaux à 2.

On suppose que  $X(\Omega) = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$  et  $Y(\Omega) = \{y_1, y_2, \dots, y_m\}$ .

On pose pour tout  $i \in [1, n]$  et tout  $j \in [1, m]$  :

$$p_i = P(X = x_i), \quad q_j = P(Y = y_j), \quad \pi_{i,j} = P((X = x_i) \cap (Y = y_j)) \quad \text{et} \quad \delta_{i,j} = \pi_{i,j} - p_i q_j$$

On suppose que pour tout  $h \in [1, n-1]$  et tout  $k \in [1, m-1]$ , la covariance de  $X^h$  et  $Y^k$  est nulle.

a) Soit  $k \in [1, m-1]$ . Montrer que pour tout  $i \in [1, n]$ , on a :  $\sum_{j=1}^m \delta_{i,j} y_j^k = 0$ .

b) En déduire que  $X$  et  $Y$  sont indépendantes.

### Exercice sans préparation S 91

Soit  $\alpha$  un réel donné. Pour tout entier  $n \geq 1$ , on pose :  $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{(n+k)^\alpha}$ .

1. Étudier suivant les valeurs de  $\alpha$ , la convergence de la suite  $(u_n)_{n \geq 1}$ . En cas de convergence, on précisera la limite de la suite  $(u_n)_{n \geq 1}$ .

2. Étudier la nature de la série de terme général  $u_n$ .

3. Soit  $x$  un réel vérifiant  $|x| < 1$ . Étudier suivant les valeurs du réel  $\alpha$ , la convergence de la série de terme général  $u_n x^n$ .

### Exercice principal S 93

1. Question de cours : Formule de l'espérance totale pour une variable aléatoire discrète  $X$  et un système complet d'événements  $(A_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ . On note  $E(X/A_n)$  l'espérance de  $X$  pour la probabilité conditionnelle  $P_{A_n}$ .

On lance indéfiniment un dé équilibré et, pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ , on note  $X_n$  le numéro sorti au  $n$ -ième tirage. Les variables aléatoires  $X_n$ , définies sur un espace probabilisé  $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ , sont donc supposées indépendantes et de même loi uniforme sur  $[1, 6]$ .

Pour tout  $i \in [1, 6]$ , on note  $T_i$  le temps d'attente de la sortie du numéro  $i$ .

2.a) Donner la loi de  $T_1$  ainsi que son espérance et sa variance.

b) Trouver l'espérance des variables aléatoires  $\text{Inf}(T_1, T_2)$  et  $\text{Sup}(T_1, T_2)$ .

3. Justifier l'existence de la covariance de  $T_1$  et de  $T_2$ , que l'on notera  $\text{Cov}(T_1, T_2)$ .

4.a) Établir, pour tout  $i \in [2, 6]$ , la relation :  $E(T_1/[X_1 = i]) = 7$ .

b) Montrer que pour tout  $i \in [3, 6]$ , on a :  $E(T_1 T_2/[X_1 = i]) = E((1 + T_1)(1 + T_2))$ .

c) Calculer  $E(T_1 T_2)$ .

d) En déduire  $\text{Cov}(T_1, T_2)$  ainsi que le coefficient de corrélation linéaire de  $T_1$  et  $T_2$ .

5.a) Trouver un réel  $\alpha$  tel que les variables aléatoires  $T_1$  et  $T_2 + \alpha T_1$  soient non corrélées.

b) Calculer l'espérance conditionnelle  $E(T_2 + \alpha T_1/[T_1 = 1])$ .

c) Les variables aléatoires  $T_1$  et  $T_2 + \alpha T_1$  sont-elles indépendantes ?

### Exercice sans préparation S 93

Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  la suite définie par :  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $u_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\tan x)^{n+2} dx$ .

1. Montrer que la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est convergente.

2.a) Calculer  $u_{n+2} + u_n$ .

b) En déduire la limite de la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  et un équivalent de  $u_n$  lorsque  $n$  tend vers  $+\infty$ .

### Exercice principal S 94

1. Question de cours : a) Convergence des séries de Riemann.

b) Établir l'encadrement strict suivant :  $1 < \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^2} < 2$ .

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . On note  $i$  le nombre complexe de module 1 et d'argument  $\pi/2$ . Pour tout  $k \in [1, n]$ , on pose :  $x_k = \frac{k\pi}{2n+1}$ . On rappelle que pour tout  $x \in ]0, \pi/2[$ ,  $\cotan x = \frac{\cos x}{\sin x}$ .

2.a) Montrer que pour tout  $x \in ]0, \pi/2[$ , on a :  $e^{2ix} = \frac{\cotan x + i}{\cotan x - i}$ .

b) En déduire que pour tout  $k \in [1, n]$ ,  $(\cotan x_k + i)^{2n+1}$  est un nombre réel.

3. Soit  $P_n$  le polynôme de  $\mathbb{R}[X]$  défini par :  $P_n(X) = \sum_{p=0}^n (-1)^p \binom{2n+1}{2p+1} X^{n-p}$ .

a) Préciser le degré de  $P_n$  ainsi que son terme de plus haut degré.

b) Pour tout  $t \in \mathbb{R}$ , déterminer (sous forme de somme) la partie imaginaire de  $(t+i)^{2n+1}$ . En déduire que pour tout  $k \in [1, n]$ ,  $\cotan^2 x_k$  est une racine de  $P_n$  et donner une factorisation de  $P_n(X)$  sous la forme d'un produit de monômes.

c) Établir la formule :  $\sum_{k=1}^n \cotan^2 x_k = \frac{n(2n-1)}{3}$ .

4.a) Montrer que pour tout  $u \in ]0, \pi/2[$ , on a :  $\cotan^2 u < \frac{1}{u^2} < 1 + \cotan^2 u$ .

b) Déduire des résultats précédents que :  $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$ .

### Exercice sans préparation S 94

Soit  $(U_n)_{n \geq 1}$  une suite de variables aléatoires indépendantes, définies sur le même espace probabilisé  $(\Omega, \mathcal{A}, P)$  et de même loi uniforme sur  $[0, 1]$ .

Soit  $N$  une variable aléatoire définie sur  $\Omega$ , indépendante de la suite  $(U_n)_{n \geq 1}$ , suivant une loi binomiale  $\mathcal{B}(n, p)$  ( $n \geq 1$  et  $0 < p < 1$ ).

On pose :  $M_n = \max(U_1, U_2, \dots, U_n)$  et  $T_n = \begin{cases} U_1 & \text{si } [N = 0] \text{ est réalisé} \\ M_k & \text{si } [N = k] \text{ est réalisé} \end{cases}$ .

Étudier la convergence en loi de la suite de variables aléatoires  $(T_n)_{n \geq 1}$ .

### Exercice principal S 101

Dans tout l'exercice,  $n$  désigne un entier supérieur ou égal à 2 et on munit l'espace vectoriel  $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$  du produit scalaire usuel défini par  $\langle X, Y \rangle = {}^tXY$ .

On note :

- $U$  la matrice-colonne de  $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$  dont tous les coefficients sont égaux à 1 ;
- $\mathcal{V}_n$  l'ensemble des matrices  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  telles que  $U$  soit un vecteur propre de  $A$  et de  ${}^tA$  ;
- $\mathcal{W}_n$  l'ensemble des matrices  $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$  de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  telles que  $\forall i \geq 2, a_{1,i} = a_{i,1} = 0$ .

On admet sans démonstration que  $\mathcal{V}_n$  et  $\mathcal{W}_n$  sont des sous-espaces vectoriels de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ .

1. Question de cours : Définition et propriétés de l'orthogonal d'un sous-espace vectoriel d'un espace euclidien.
2. Déterminer la dimension de  $\mathcal{W}_n$ .
3. Soit  $A \in \mathcal{V}_n$ . On note  $\lambda$  (respectivement  $\mu$ ) la valeur propre de  $A$  (resp. de  ${}^tA$ ) associée au vecteur propre  $U$ . Exprimer la somme de tous les coefficients de  $A$  en fonction de  $\lambda$ . Comparer  $\lambda$  et  $\mu$ .

4.a) Déterminer  $\mathcal{V}_2$  ainsi que sa dimension.

b) Montrer que pour tout  $(a, b, c, d, e) \in \mathbb{R}^5$ , il existe une unique matrice  $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq 3}$  de  $\mathcal{V}_3$  telle que  $a_{1,1} = a, a_{1,2} = b, a_{1,3} = c, a_{2,1} = d$  et  $a_{2,2} = e$ . En déduire la dimension de  $\mathcal{V}_3$ .

5. Soit  $P = (p_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$  une matrice orthogonale de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  dont la première colonne est égale à  $\frac{1}{\sqrt{n}}U$ .

Pour  $j \in [1, n]$ , on note  $C_j$  la  $j$ -ième colonne de  $P$ . Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ .

- a) Justifier l'existence d'une telle matrice  $P$ .
- b) Montrer que la matrice  $B = {}^tPAP$  a pour terme général  $b_{i,j} = \langle C_i, AC_j \rangle$ .
- c) En déduire que  $A \in \mathcal{V}_n$  si et seulement si  ${}^tPAP \in \mathcal{W}_n$ .
- d) En déduire la dimension de  $\mathcal{V}_n$ .

### Exercice sans préparation S 101

Soit  $n_1 \in \mathbb{N}^*, n_2 \in \mathbb{N}^*$  et  $p \in ]0, 1[$ . On considère deux variables aléatoires indépendantes  $X_1$  et  $X_2$  définies sur un espace probabilisé  $(\Omega, \mathcal{A}, P)$  :  $X_1$  suit la loi binomiale de paramètres  $(n_1, p)$  et  $X_2$  suit la loi binomiale de paramètres  $(n_2, p)$ .

1. Soit  $n \in (X_1 + X_2)(\Omega)$ . Déterminer la loi conditionnelle de  $X_1$  sachant l'événement  $[X_1 + X_2 = n]$ .
2. Calculer l'espérance conditionnelle  $E(X_1/X_1 + X_2 = n)$ .

### Exercice principal S 104

Toutes les variables aléatoires de cet exercice sont à densité et définies sur un même espace probabilisé  $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ . Sous réserve d'existence, on note  $E(X)$  l'espérance d'une variable aléatoire  $X$ .

1. Question de cours : Rappeler la définition du rang d'une matrice. Quelle est, selon les valeurs des réels  $a$ ,  $b$ ,  $c$  et  $d$  le rang de la matrice  $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$  ?

Dans tout l'exercice,  $X$ ,  $Y$  et  $Z$  sont trois variables aléatoires ayant des moments d'ordre 2.

On admet que chacune des variables aléatoires  $XY$ ,  $XZ$  et  $YZ$  admet une espérance et on suppose que la condition suivante est vérifiée :  $E(X^2)E(Y^2) - (E(XY))^2 \neq 0$ .

Pour tout  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ , on pose :  $f(x, y) = E((Z - xX - yY)^2)$ .

2.a) Établir les inégalités strictes :  $E(X^2) > 0$  et  $E(Y^2) > 0$ .

b) Montrer que pour tout couple  $(x, y) \in (\mathbb{R}^*)^2$ , on a :  $E((xX + yY)^2) > 0$ .

3.a) Montrer que la fonction  $f$  est de classe  $C^1$  sur  $\mathbb{R}^2$  et qu'elle admet un unique point critique  $(x_0, y_0)$ .

b) Montrer que pour tout couple  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ , on a :  $E((Z - x_0X - y_0Y)(xX + yY)) = 0$ .

c) En déduire l'égalité :  $E((Z - xX - yY)^2) = E((Z - x_0X - y_0Y)^2) + E([(x - x_0)X - (y_0 - y)Y]^2)$ .

d) Étudier les extremums de  $f$ .

4. Dans cette question, on suppose que  $X$  et  $Y$  sont indépendantes et suivent toutes les deux la loi uniforme sur l'intervalle  $[0, 1]$  et on pose  $Z = X^2$ .

Déterminer l'ensemble des couples  $(x_0, y_0)$  pour lesquels  $E((Z - xX - yY)^2)$  est minimale.

(on admet que le résultat relatif à l'espérance d'un produit de variables aléatoires discrètes indépendantes s'applique au cas où les deux variables aléatoires sont à densité)

### Exercice sans préparation S 104

Soit  $M$  une matrice de  $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$  non nulle telle que  $M^2 = 0$ .

Montrer que  $M$  est semblable à la matrice  $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ .

### Exercice principal S 110

Soit  $E$  un espace vectoriel de dimension finie  $n \geq 2$  sur  $\mathbb{R}$ . Soit  $f$  un endomorphisme de  $E$  pour lequel il existe un entier  $m \geq 2$ , des endomorphismes  $p_1, p_2, \dots, p_m$  non nuls de  $E$  et  $m$  réels distincts  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ , tels que pour tout entier  $k \in \mathbb{N}$ , on a :  $f^k = \sum_{i=1}^m \lambda_i^k p_i$ , où  $f^k = \underbrace{f \circ f \circ \dots \circ f}_{k \text{ fois}}$ . On note  $\text{id}$  l'endomorphisme identité de  $E$ .

1. Question de cours : Énoncer une condition nécessaire et suffisante de diagonalisabilité d'une matrice.
2. Soit  $P$  un polynôme de  $\mathbb{R}[X]$ . Exprimer  $P(f)$  en fonction des  $P(\lambda_i)$  et des  $p_i$  pour  $i \in [1, m]$ .

3. Soit  $Q$  le polynôme de  $\mathbb{R}[X]$  défini par  $Q(X) = \prod_{i=1}^m (X - \lambda_i)$ . Calculer  $Q(f)$ .  
Qu'en déduit-on quant aux valeurs propres de  $f$  ?

4. Pour tout  $k \in [1, m]$ , on pose :  $L_k(X) = \prod_{\substack{i \in [1, m] \\ i \neq k}} \frac{(X - \lambda_i)}{(\lambda_k - \lambda_i)}$ .

Calculer  $L_k(f)$ . En déduire que  $\text{Im}(p_k) \subset \text{Ker}(f - \lambda_k \text{id})$  ainsi que l'ensemble des valeurs propres de  $f$ .

5. Montrer que  $f$  est diagonalisable.

6. Vérifier que pour tout couple  $(i, j) \in [1, m]^2$ , on a :  $p_i \circ p_j = \begin{cases} 0 & \text{si } i \neq j \\ p_i & \text{si } i = j \end{cases}$ .

7. Soit  $F$  le sous-espace vectoriel de  $\mathcal{L}(E)$  (ensemble des endomorphismes de  $E$ ) engendré par  $(p_1, p_2, \dots, p_m)$ . Déterminer la dimension de  $F$ .

### Exercice sans préparation S 110

Soit  $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite de variables aléatoires indépendantes de même loi normale centrée réduite, et soit un nombre réel  $\theta \neq 0$ . On pose :  $Y_0 = X_0$  et  $\forall n \geq 1, Y_n = \theta Y_{n-1} + X_n$ .

1. Déterminer pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ , la loi de  $Y_n$ .
2. Calculer pour tout  $h \in \mathbb{N}^*$ ,  $\text{Cov}(Y_n, Y_{n+h})$ .

### Exercice principal S 112

1. Question de cours : Énoncer le théorème du prolongement de la dérivée.

On cherche les fonctions  $f$  définies sur  $\mathbb{R}$ , à valeurs réelles, telles que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, (f'(x))^2 - 2f(x)f''(x) = 0 \quad (E)$$

2. Soit  $(a, b)$  un couple de réels et  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$ , à valeurs réelles, telle que :

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 & \text{si } x \geq 0 \\ bx^2 & \text{si } x < 0 \end{cases}.$$

Quelle condition doivent satisfaire  $a$  et  $b$  pour que la fonction  $f$  vérifie pour tout  $x \in \mathbb{R}$  la relation (E) ?

3.a) Montrer que si une fonction polynomiale non nulle  $f$  vérifie (E), son degré est nécessairement égal à 0 ou 2.

b) Déterminer sous forme factorisée, les fonctions polynomiales qui vérifient pour tout  $x \in \mathbb{R}$  la relation (E).

4. Soit  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$  et  $f$  une fonction définie sur  $I$  à valeurs réelles.

On suppose que  $f$  vérifie les conditions (C) suivantes :

- la dérivée  $f'$  ne s'annule pas sur  $I$  ;
- la relation (E) est vérifiée pour tout  $x \in I$ .

a) On pose pour tout  $x \in I$  :  $g(x) = \frac{f(x)}{(f'(x))^2}$ . Calculer pour tout  $x \in I$ , la dérivée  $g'(x)$  au point  $x$ .

b) Établir l'existence d'une constante réelle  $k$  strictement positive telle que pour tout  $x \in I$ , la dérivée de  $\sqrt{f(x)}$  soit égale à  $\frac{1}{2\sqrt{k}}$ .

c) En déduire que toutes les fonctions  $f$  qui vérifient les conditions (C) sont de la forme :  $f(x) = \alpha(x - r)^2$ , avec  $\alpha \neq 0$  et  $r \notin I$ .

### Exercice sans préparation S 112

On tire avec remise une boule d'une urne contenant  $n$  boules numérotées. On note  $X$  la variable aléatoire égale au numéro du tirage où pour la première fois, chaque boule a été tirée au moins une fois.

Calculer l'espérance de  $X$  et en trouver un équivalent quand  $n$  tend vers  $+\infty$ .

### Exercice principal S 113

Soit  $E$  un espace euclidien muni du produit scalaire canonique  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  et de la norme associée  $\| \cdot \|$ . Soit  $p$  et  $r$  deux projecteurs orthogonaux distincts de  $E$ . On note  $\text{id}$  l'endomorphisme identité de  $E$ .

1. Question de cours : Définition et propriétés d'un projecteur orthogonal.
2. Dans cette question uniquement, on suppose que  $p$  et  $r$  commutent.
  - a) Montrer que  $p \circ r$  est un projecteur orthogonal.
  - b) Dans le cas où  $p \circ r$  est non nul, déterminer ses valeurs propres.
  - c) Montrer que  $\text{Ker}(p \circ r) = \text{Ker}(p) + \text{Ker}(r)$  et  $\text{Im}(p \circ r) = \text{Im}(p) \cap \text{Im}(r)$ .
3. Soit  $x$  un vecteur propre de  $p \circ r$  associé à la valeur propre  $\lambda$ .
  - a) Dans le cas où  $\lambda \neq 0$ , montrer que  $x \in \text{Ker}(p - \text{id})$  et  $(r(x) - \lambda x) \in \text{Ker}(p)$ .
  - b) Calculer  $\langle x, r(x) - \lambda x \rangle$ . En déduire l'encadrement :  $0 \leq \lambda \leq 1$ .
4. On suppose que l'ensemble des valeurs propres de  $p \circ r$  est inclus dans  $\{0, 1\}$ . On pose  $p_1 = p$ ,  $p_2 = \text{id} - p$  et pour tout  $(i, j) \in \{1, 2\}$ , on pose  $a_{i,j} = p_i \circ r \circ p_j$ .
  - a) Calculer  $a_{1,1} + a_{1,2}$ ,  $a_{1,1} + a_{2,1}$  et  $a_{1,2} \circ a_{2,1} - (\text{id} - p \circ r) \circ a_{1,1}$ .
  - b) Montrer que  $a_{1,1}$  est diagonalisable.
  - c) Montrer que  $p$  et  $r$  commutent.

### Exercice sans préparation S 113

Soit  $\mathcal{E}$  un ensemble de variables aléatoires discrètes centrées définies sur un même espace probabilisé et admettant une variance.

1. Justifier l'existence de  $V_0 = \inf\{V(X); X \in \mathcal{E}\}$ .
2. On suppose que pour tout  $(X_1, X_2) \in \mathcal{E}^2$ , on a  $\frac{1}{2}(X_1 + X_2) \in \mathcal{E}$ .  
Soit  $(X_1, X_2) \in \mathcal{E}^2$  avec  $V(X_1) = V(X_2) = V_0$ . Montrer que  $X_1 = X_2$  presque sûrement.

### Exercice principal S 116

1. Question de cours : Définition et propriétés de la fonction de répartition d'une variable aléatoire à densité.

Soit  $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  une suite de variables aléatoires indépendantes, définies sur un espace probabilisé  $(\Omega, \mathcal{A}, P)$  et de même loi uniforme sur l'intervalle  $]0, 1]$ . On note  $F$  la fonction de répartition de  $X_1$ .

On pose pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $Z_n = \prod_{k=1}^n X_k$  et pour tout  $k \in [1, n]$ ,  $Y_k = -\ln X_k$ .

2.a) Calculer pour tout  $s \in \mathbb{N}$ ,  $E(Z_n^s)$ .

b) Quelle est la loi de  $Y_1$  ?

c) En déduire la loi de  $T_n = \sum_{k=1}^n Y_k$ .

d) Déterminer une densité  $f_{Z_n}$  de la variable aléatoire  $Z_n$ .

3. Soit  $r$  un entier naturel et  $z \in ]0, 1]$ .

a) Établir la convergence de l'intégrale  $\int_0^z (-\ln t)^r dt$ .

b) À l'aide du changement de variable  $y = -\ln t$  dont on justifiera la validité, montrer que l'on a :

$$\frac{1}{r!} \int_{-\ln z}^{+\infty} y^r e^{-y} dy = z \times \sum_{k=0}^r \frac{(-\ln z)^k}{k!}.$$

c) En déduire la fonction de répartition  $F_{Z_n}$  de  $Z_n$ .

4. Étudier la convergence en loi de la suite de variables aléatoires  $(Z_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ .

### Exercice sans préparation S 116

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$  et soit  $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$  la matrice de  $M_n(\mathbb{R})$  définie par :  $a_{i,j} = 1$  si  $i \neq j$  et  $a_{i,i} > 1$  pour tout  $i \in [1, n]$ .

1. Montrer que pour tout  $X \in \mathbb{R}^n$  non nul, on a :  ${}^t X A X > 0$ .

2. Justifier que  $A$  est diagonalisable et inversible.

## 2. SUJETS DE L'OPTION ÉCONOMIQUE

### Exercice principal E 26

1. Question de cours : Définition de l'indépendance de deux variables aléatoires discrètes. Lien entre indépendance et covariance.

Soit  $X$  et  $Y$  deux variables aléatoires discrètes finies à valeurs dans  $\mathbb{N}$ , définies sur un espace probabilisé  $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ . On suppose que  $X(\Omega) \subset [0, n]$  et  $Y(\Omega) \subset [0, m]$ , où  $n$  et  $m$  sont deux entiers de  $\mathbb{N}^*$ .

Pour tout couple  $(i, j) \in [0, n] \times [0, m]$ , on pose :  $p_{i,j} = P((X = i) \cap (Y = j))$ .

Soit  $F_X$  et  $F_Y$  les deux fonctions de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  définies par :  $F_X(x) = \sum_{i=0}^n P(X = i)x^i$  et  $F_Y(y) = \sum_{j=0}^m P(Y = j)y^j$ .

Soit  $Z = (X, Y)$  et  $G_Z$  la fonction de  $\mathbb{R}^2$  dans  $\mathbb{R}$  définie par :  $G_Z(x, y) = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m p_{i,j} x^i y^j$ .

2. Donner la valeur de  $G_Z(1, 1)$  et exprimer les espérances de  $X$ ,  $Y$  et  $XY$ , puis la covariance de  $(X, Y)$  à l'aide des dérivées partielles premières et secondes de  $G_Z$  au point  $(1, 1)$ .

3. Soit  $f$  une fonction polynomiale de deux variables définie sur  $\mathbb{R}^2$  par :  $f(x, y) = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m a_{i,j} x^i y^j$  avec  $a_{i,j} \in \mathbb{R}$ .

On suppose que pour tout couple  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ , on a  $f(x, y) = 0$ .

a) Montrer que pour tout  $(i, j) \in [0, n] \times [0, m]$ , on a  $a_{i,j} = 0$ .

b) En déduire que  $X$  et  $Y$  sont indépendantes, si et seulement si, pour tout  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ ,  $G_Z(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$ . (on pourra poser :  $a_{i,j} = p_{i,j} - P(X = i)P(Y = j)$ )

4. Une urne contient des jetons portant chacun une des lettres  $A$ ,  $B$  ou  $C$ . La proportion des jetons portant la lettre  $A$  est  $p$ , celle des jetons portant la lettre  $B$  est  $q$  et celle des jetons portant la lettre  $C$  est  $r$ , où  $p$ ,  $q$  et  $r$  sont trois réels strictement positifs vérifiant  $p + q + r = 1$ .

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . On effectue  $n$  tirages d'un jeton avec remise dans cette urne. On note  $X$  (resp.  $Y$ ) la variable aléatoire égale au nombre de jetons tirés portant la lettre  $A$  (resp.  $B$ ) à l'issue de ces  $n$  tirages.

a) Quelles sont les lois de  $X$  et  $Y$  respectivement ? Déterminer  $F_X$  et  $F_Y$ .

b) Déterminer la loi de  $Z$ . En déduire  $G_Z$ .

c) Les variables aléatoires  $X$  et  $Y$  sont-elles indépendantes ?

d) Calculer la covariance de  $(X, Y)$ . Le signe de cette covariance était-il prévisible ?

### Exercice sans préparation E 26

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $A$  une matrice de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  telle que  $A^t A^t A A = I$ , où  $I$  est la matrice identité de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ .

1. Montrer que la matrice  $A$  est symétrique.

2. Déterminer  $A$ .

### Exercice principal E 31

1. Question de cours : Définition et représentation graphique de la fonction partie entière.

On note  $E$  l'espace vectoriel des applications de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  et  $F$  le sous-espace vectoriel de  $E$  engendré par les quatre fonctions  $f_0, f_1, f_2$  et  $f_3$  définies par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f_0(x) = 1, f_1(x) = x, f_2(x) = e^x, f_3(x) = x e^x.$$

2. On note :  $\mathcal{B} = (f_0, f_1, f_2, f_3)$ .

a) Montrer que  $\mathcal{B}$  est une base de  $F$ .

b) Montrer que toutes les fonctions de  $F$  sont continues et dérivables sur  $\mathbb{R}$ .

3. Soit  $\Phi$  l'application définie par : pour tout  $f \in F$ ,  $\Phi(f) = f'$ , où  $f'$  est la dérivée de  $f$ .

a) Justifier que  $\Phi$  est un endomorphisme de  $F$  et écrire la matrice  $M$  de  $\Phi$  dans la base  $\mathcal{B}$ .

b) L'endomorphisme  $\Phi$  est-il diagonalisable ?

c) Montrer que  $f_3$  appartient à  $\text{Im } \Phi$  et résoudre dans  $F$  l'équation :  $\Phi(f) = f_3$ .

4. On note  $G$  l'ensemble des fonctions  $g$  de  $E$  telles que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, g(x+1) - g(x) = 0.$$

a) Montrer que  $G$  est un sous-espace vectoriel de  $E$  et trouver  $F \cap G$ .

b) Trouver un élément de  $G$  qui n'appartienne pas à  $F$ .

5. Trouver toutes les fonctions de  $F$  vérifiant :  $\forall x \in \mathbb{R}, f(x+1) - f(x) = (e-1)f'(x)$ .

### Exercice sans préparation E 31

Soit  $p$  un réel de  $]0, 1[$  et  $q = 1 - p$ . Soit  $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  une suite de variables aléatoires indépendantes définies sur un espace probabilisé  $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ , de même loi de Bernoulli telle que :

$\forall k \in \mathbb{N}^*, P([X_k = 1]) = p$  et  $P([X_k = 0]) = q$ . Pour  $n$  entier de  $\mathbb{N}^*$ , on définit pour tout  $k \in [1, n]$  la variable aléatoire  $Y_k = X_k + X_{k+1}$ .

1.a) Calculer pour tout  $k \in [1, n]$ ,  $\text{Cov}(Y_k, Y_{k+1})$ .

b) Montrer que  $0 < \text{Cov}(Y_k, Y_{k+1}) \leq \frac{1}{4}$ .

2. Calculer pour tout couple  $(k, l)$  tel que  $1 \leq k < l \leq n$ ,  $\text{Cov}(Y_k, Y_l)$ .

3. On note  $\varepsilon$  un réel strictement positif fixé. Montrer que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n Y_k - 2p\right| > \varepsilon\right) = 0$ .

### Exercice principal E 38

1. Question de cours : Définition de deux matrices semblables.

Soit  $E$  un espace vectoriel sur  $\mathbb{R}$  de dimension 2. On note  $\mathcal{L}(E)$  l'ensemble des endomorphismes de  $E$ .

Pour toute matrice  $A = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ , on note  $D$  et  $T$  les deux applications suivantes :

$$D : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}, A \mapsto ad - bc \quad \text{et} \quad T : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}, A \mapsto a + d.$$

2. Soit  $A$  et  $B$  deux matrices de  $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ .

a) Exprimer  $D(AB)$  en fonction de  $D(A)$  et  $D(B)$ . Montrer que  $T(AB) = T(BA)$ .

b) En déduire que si  $A$  et  $B$  sont semblables, on a  $D(A) = D(B)$  et  $T(A) = T(B)$ .

3. Déterminer  $\text{Ker } D$  et  $\text{Ker } T$ . Quelle est la dimension de  $\text{Ker } T$  ?

Dorénavant, si  $u \in \mathcal{L}(E)$  de matrice  $A$  dans une base  $\mathcal{B}$  de  $E$ , on note :  $D(u) = D(A)$  et  $T(u) = T(A)$ .

4. On note  $\text{id}_E$  l'endomorphisme identité de  $E$ . Exprimer  $u^2 = u \circ u$  en fonction de  $u$  et  $\text{id}_E$ .

5. Soit  $u \in \mathcal{L}(E)$  et  $\mathcal{S}_0 = \{v \in \mathcal{L}(E) \mid u \circ v - v \circ u = 0\}$ .

Montrer que  $\mathcal{S}_0$  est un espace vectoriel contenant  $\{P(u), P \in \mathbb{R}[X]\}$ .

6. Soit  $u \in \mathcal{L}(E)$  avec  $u \neq 0$ . On pose :  $\mathcal{S} = \{v \in \mathcal{L}(E) \mid u \circ v - v \circ u = u\}$ .

a) Montrer que si  $\mathcal{S}$  est non vide, alors l'endomorphisme  $u$  ne peut être bijectif. En déduire une condition nécessaire portant sur  $u^2$  pour que  $\mathcal{S}$  soit non vide.

b) On suppose que  $\mathcal{S}$  est non vide. Établir l'existence d'une base  $\mathcal{B}_1 = (e_1, e_2)$  de  $E$  dans laquelle la matrice  $M_u$  de  $u$  s'écrit  $M_u = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$  et déterminer la forme générale de la matrice des éléments  $v$  de  $\mathcal{S}$  dans cette même base.

c) On suppose que  $\mathcal{S}$  est non vide. Montrer que  $\mathcal{S} = \{v_0 + \alpha \text{id}_E + \beta u, \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}$  où  $v_0$  est un endomorphisme non inversible de  $E$  à déterminer.

### Exercice sans préparation E 38

Soit  $k$  et  $\lambda$  deux réels et soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  à valeurs réelles donnée par :

$$f(t) = \begin{cases} k t e^{-\lambda t} & \text{si } t \geq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}.$$

1. Exprimer  $k$  en fonction de  $\lambda$  pour que  $f$  soit une densité de probabilité.

On note  $X$  une variable aléatoire réelle ayant  $f$  pour densité.

2. Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ , la variable aléatoire  $X$  admet un moment d'ordre  $n$  que l'on calculera.

### Exercice principal E 39

1. Question de cours : Loi d'un couple de variables aléatoires discrètes. Lois marginales. Lois conditionnelles.

Soit  $c$  un réel strictement positif et soit  $X$  et  $Y$  deux variables aléatoires à valeurs dans  $\mathbb{N}$  définies sur un espace probabilisé  $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ , telles que :

$$\forall (i, j) \in \mathbb{N}^2, P(\{X = i\} \cap \{Y = j\}) = c \frac{i+j}{i!j!}.$$

2.a) Montrer que pour tout  $i \in \mathbb{N}$ , on a :  $P(X = i) = c \frac{(i+1)}{i!}$  e. En déduire la valeur de  $c$ .

b) Montrer que  $X$  admet une espérance et une variance et les calculer.

c) Les variables aléatoires  $X$  et  $Y$  sont-elles indépendantes ?

3.a) Déterminer la loi de  $X + Y - 1$ .

b) En déduire la variance de  $X + Y$ .

c) Calculer la covariance de  $X$  et de  $X + 5Y$ . Les variables aléatoires  $X$  et  $X + 5Y$  sont-elles indépendantes ?

4. On pose :  $Z = \frac{1}{X+1}$ .

a) Montrer que  $Z$  admet une espérance et la calculer.

b) Déterminer pour  $i \in \mathbb{N}$ , la loi conditionnelle de  $Y$  sachant  $\{X = i\}$ .

c) Pour  $A \in \mathcal{A}$ , on pose :  $g_A(Y) = \sum_{k=0}^{+\infty} k P_A(Y = k)$ .

Établir l'existence d'une fonction affine  $f$  telle que, pour tout  $\omega \in \Omega$ , on a :  $g_{\{X=X(\omega)\}}(Y) = f(Z(\omega))$ .

### Exercice sans préparation E 39

1. La somme de deux matrices diagonalisables est-elle diagonalisable ?

2. La somme de deux matrices inversibles est-elle inversible ?

3. Montrer que toute matrice carrée est la somme de deux matrices inversibles.

### Exercice principal E 43

On note  $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$  l'ensemble des matrices carrées d'ordre 3 et  $\mathbb{R}_2[X]$  l'ensemble des polynômes à coefficients réels de degré inférieur ou égal à 2.

Dans tout l'exercice,  $A$  est une matrice de  $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$  ayant trois valeurs propres distinctes, notées  $\lambda_1, \lambda_2$  et  $\lambda_3$ .

1. Question de cours : Définition d'un polynôme annulateur d'une matrice. Lien avec les valeurs propres.

2.a) Donner en fonction de  $\lambda_1, \lambda_2$  et  $\lambda_3$ , un polynôme annulateur de  $A$  de degré 3.

b) Peut-on trouver un polynôme annulateur de  $A$  de degré 1 ou de degré 2 ?

3. Soit  $\varphi$  l'application de  $\mathbb{R}_2[X]$  dans  $\mathbb{R}^3$  qui à tout polynôme  $P \in \mathbb{R}_2[X]$ , associe le triplet  $(P(\lambda_1^5), P(\lambda_2^5), P(\lambda_3^5))$ .

a) Montrer que l'application  $\varphi$  est linéaire.

b) Déterminer  $\text{Ker } \varphi$ .

c) L'application  $\varphi$  est-elle un isomorphisme de  $\mathbb{R}_2[X]$  sur  $\mathbb{R}^3$  ?

d) Établir l'existence d'un unique polynôme  $Q \in \mathbb{R}_2[X]$  tel que : pour tout  $i \in [1, 3]$ ,  $Q(\lambda_i^5) = \lambda_i$ .

e) Soit  $T$  le polynôme défini par :  $T(X) = Q(X^5) - X$ .

Montrer que le polynôme  $T$  est un polynôme annulateur de  $A$ .

4. On note  $\mathcal{E}$  et  $\mathcal{F}$  les deux sous-ensembles de  $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$  suivants :

$$\mathcal{E} = \{N \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R}) \mid AN = NA\} \text{ et } \mathcal{F} = \{N \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R}) \mid A^5N = NA^5\}.$$

Déduire des questions précédentes que  $\mathcal{E} = \mathcal{F}$ .

### Exercice sans préparation E 43

Soit  $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  une suite de variables aléatoires définies sur un espace probabilisé  $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ , indépendantes et de même loi exponentielle de paramètre  $\lambda > 0$ .

Pour  $n \in \mathbb{N}^*$ , on pose :  $M_n = \max(X_1, \dots, X_n)$  et on admet que  $M_n$  est une variable aléatoire définie sur  $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ .

1. Déterminer la loi de  $M_n$ .

2. Montrer que l'application  $g$  qui à tout réel  $x$  associe  $g(x) = e^{-x} \exp(-e^{-x})$  est une densité de probabilité.

3. Soit  $Y$  une variable aléatoire définie sur  $(\Omega, \mathcal{A}, P)$  de densité  $g$ .

Montrer que la suite de variables aléatoires  $(\lambda M_n - \ln n)_{n \geq 1}$  converge en loi vers  $Y$ .

### Exercice principal E 46

1. Question de cours : Définition de la convergence d'une série numérique (à termes réels).

Dans tout l'exercice,  $a$  est un réel strictement supérieur à 1.

2.a) Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ , l'intégrale  $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+t^a)^n}$  est convergente. On pose alors pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$  :

$$u_n(a) = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+t^a)^n}.$$

b) Établir la convergence de la suite  $(u_n(a))_{n \in \mathbb{N}^*}$ .

3.a) Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ , on a :  $u_n(a) = a n (u_n(a) - u_{n+1}(a))$ . En déduire  $u_n(a)$  en fonction de  $u_1(a)$ .

b) Montrer que la série de terme général  $\left(\frac{u_n(a)}{a n}\right)$  est convergente.

c) En déduire la limite de la suite  $(u_n(a))_{n \in \mathbb{N}^*}$ .

4. On pose pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$  :  $w_n(a) = \ln(u_n(a)) + \frac{\ln n}{a}$ .

a) Montrer que la série de terme général  $(w_{n+1}(a) - w_n(a))$  est convergente.

b) En déduire l'existence d'un réel  $K(a)$  tel que  $u_n(a)$  soit équivalent à  $\frac{K(a)}{n^{\frac{1}{a}}}$  lorsque  $n$  tend vers  $+\infty$ .

### Exercice sans préparation E 46

Les variables aléatoires sont définies sur un espace probabilisé  $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ .

Soit  $X$  une variable aléatoire qui suit la loi de Poisson de paramètre  $\lambda > 0$  et soit  $Y$  une variable aléatoire indépendante de  $X$  telle que :  $Y(\Omega) = \{1, 2\}$ ,  $P(Y = 1) = P(Y = 2) = \frac{1}{2}$ . On pose :  $Z = XY$ .

1. Déterminer la loi de  $Z$ .

2. On admet que :  $\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\lambda^{2k}}{(2k)!} = \frac{e^\lambda + e^{-\lambda}}{2}$ . Quelle est la probabilité que  $Z$  prenne des valeurs paires ?

### Exercice principal E 47

1. Question de cours : Critères de convergence d'une intégrale impropre.

Préciser la nature de l'intégrale  $\int_a^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha}$ , où  $a$  est un réel strictement positif et  $\alpha$  un réel quelconque.

Soit  $T$  une variable aléatoire définie sur un espace probabilisé  $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ , suivant la loi normale centrée réduite. On note  $\Phi$  et  $\varphi$  respectivement, la fonction de répartition et une densité de  $T$ .

2.a) À l'aide de l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev, montrer que pour tout  $x > 0$ , on a :  $0 \leq 1 - \Phi(x) \leq \frac{1}{2x^2}$ .

b) En déduire que l'intégrale  $\int_0^{+\infty} (1 - \Phi(x)) dx$  est convergente et calculer sa valeur.

3. On note  $\varphi'$  la dérivée de  $\varphi$ .

a) Déterminer pour tout  $x \in \mathbb{R}$ , une relation entre  $\varphi'(x)$  et  $\varphi(x)$ .

b) En déduire, à l'aide de deux intégrations par parties, que pour tout  $x \in \mathbb{R}_+^*$ , on a :  $\frac{1}{x} - \frac{1}{x^3} \leq \frac{1 - \Phi(x)}{\varphi(x)} \leq \frac{1}{x}$ .

c) Donner un équivalent de  $1 - \Phi(x)$  lorsque  $x$  tend vers  $+\infty$ .

4. Soit  $a > 0$ . Calculer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( P_{[T > x]} \left[ T > x + \frac{a}{x} \right] \right)$ .

### Exercice sans préparation E 47

Soit  $D$  la matrice définie par :  $D = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$ .

1. Déterminer les matrices  $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$  telles que  $AD = DA$ .

2. En déduire les matrices  $M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$  qui vérifient  $M^3 - 2M = D$ .

### Exercice principal E 49

1. Question de cours : Définition de deux matrices semblables.

Soit  $f$  un endomorphisme de  $\mathbb{R}^3$  dont la matrice  $A$  dans la base canonique de  $\mathbb{R}^3$  est donnée par :

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

On note  $\text{id}$  l'endomorphisme identité de  $\mathbb{R}^3$  et on pose :  $f^2 = f \circ f$ .

2.a) Montrer que  $2f - f^2 = \text{id}$ .

b) Montrer que l'endomorphisme  $f$  est un automorphisme. Quel est l'automorphisme réciproque de  $f$  ?

c) Montrer que  $f$  admet l'unique valeur propre  $\lambda = 1$ . L'endomorphisme  $f$  est-il diagonalisable ?

d) Déterminer le sous-espace propre associé à la valeur propre 1. Quelle est sa dimension ?

3.a) Calculer pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $A^n$  en fonction de  $n$ .

b) Le résultat précédent s'étend-t-il au cas où  $n \in \mathbb{Z}$  ?

4. Déterminer une base  $(u, v, w)$  de  $\mathbb{R}^3$  dans laquelle la matrice de  $f$  est la matrice  $C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ .

### Exercice sans préparation E 49

Soit  $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  une suite de variables aléatoires réelles indépendantes définies sur le même espace probabilisé  $(\Omega, \mathcal{A}, P)$  et suivant toutes la loi uniforme sur l'intervalle  $[0, 1]$ .

1. Pour tout entier  $k \geq 1$ , déterminer une densité de la variable aléatoire  $Y_k = \max(X_1, X_2, \dots, X_k)$ .

2. Déterminer une densité de la variable aléatoire  $Z_k = -Y_k$ .

### Exercice principal E 63

1. Question de cours : Énoncer une condition nécessaire et suffisante de diagonalisabilité d'un endomorphisme.

On considère la matrice  $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$  définie par  $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ .

2. On note  $\mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{R})$  l'espace vectoriel des matrices à 2 lignes et 1 colonne à coefficients réels.

Soit  $u$  l'endomorphisme de  $\mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{R})$  défini par : pour tout  $X \in \mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{R})$ ,  $u(X) = AX$ .

a) Déterminer une base de  $\text{Ker } u$  et une base de  $\text{Im } u$ .

b) L'endomorphisme  $u$  est-il diagonalisable ?

c) Calculer pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ , la matrice  $A^n$ .

3. Soit  $v$  l'endomorphisme de  $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$  défini par : pour tout  $M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ ,  $v(M) = AM$ .

On note  $\mathcal{B} = (E_{1,1}, E_{1,2}, E_{2,1}, E_{2,2})$  la base canonique de  $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$  et on rappelle que :

$$E_{1,1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_{1,2} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_{2,1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, E_{2,2} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

a) Écrire la matrice  $V$  de l'endomorphisme  $v$  dans la base  $\mathcal{B}$ .

b) Déterminer une base de  $\text{Ker } v$  et une base de  $\text{Im } v$ .

c) L'endomorphisme  $v$  est-il diagonalisable ?

### Exercice sans préparation E 63

Soit  $n$  un entier supérieur ou égal à 2. On dispose de  $n$  urnes  $U_1, U_2, \dots, U_n$  contenant chacune trois boules. Dans l'ensemble des  $3n$  boules, une seule est rouge, les autres étant bleues.

Sachant que l'on a tiré sans remise deux boules bleues dans l'urne  $U_1$ , quelle est la probabilité que l'urne  $U_2$  contienne la boule rouge ?

### 3. SUJETS DE L'OPTION TECHNOLOGIQUE

#### Exercice principal T 11

1. Question de cours : Définition d'une densité de probabilité d'une variable aléatoire à densité.

Pour tout entier  $n \geq 1$ , on pose :  $I_n = \int_0^1 \frac{x^n}{1+x^n} dx$ .

2. Établir l'égalité :  $I_1 = 1 - \ln 2$ .

3. Montrer que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$ .

4. Pour tout entier  $n \geq 1$ , on définit la fonction  $f_n$  par :  $f_n(x) = \begin{cases} \frac{x^n}{1+x^n} & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$ .

a) Établir, pour tout entier  $n \geq 1$ , l'existence d'un réel  $a_n$  tel que la fonction  $g_n$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $g_n(x) = a_n f_n(x)$  soit une densité de probabilité d'une variable aléatoire à densité  $X_n$ .

b) Quelle est la limite de  $a_n$  lorsque  $n$  tend vers  $+\infty$  ?

5.a) Calculer les réels  $a$ ,  $b$  et  $c$  tels que pour tout  $x \in [0, 1]$ , on a :  $\frac{x^2}{1+x} = ax + b + \frac{c}{1+x}$ .

b) En déduire l'espérance de la variable aléatoire  $X_1$ .

6.a) Établir pour tout  $x \in [0, 1]$ , l'encadrement :  $0 \leq \ln(1+x) \leq x$ .

b) À l'aide d'une intégration par parties, montrer que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{nI_n}{\ln 2} = 1$ .

#### Exercice sans préparation T 11

Soit  $A$ ,  $D$  et  $P$  les matrices carrées d'ordre 2 suivantes :  $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ ,  $D = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$  et  $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ .

1.a) Montrer que  $P$  est inversible et calculer son inverse  $P^{-1}$ .

b) Calculer  $AP$  et  $PD$ . En déduire que  $A = PDP^{-1}$ .

2. Pour tout entier naturel  $n$ , calculer  $A^n$ .

### Exercice principal T 12

1. Question de cours : Définition d'une matrice inversible.

On note  $\mathcal{C}$  l'ensemble des matrices  $A$  carrées d'ordre 2 pour lesquelles il existe une matrice  $B$  carrée d'ordre 2 telle que  $B^2 = A$ . On note  $I$  la matrice identité d'ordre 2.

2. Montrer que si  $B^2 = A$ , alors  $AB = BA$ .

3. Soit  $B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ .

a) Calculer  $B^2$ .

b) En déduire que pour tout réel  $r$ , on a :  $rI \in \mathcal{C}$ .

4. Soit  $a$  et  $b$  deux réels distincts et  $A = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}$ .

a) Déterminer les matrices qui commutent avec  $A$  (deux matrices  $X$  et  $Y$  commutent si  $XY = YX$ ).

b) Donner une condition nécessaire et suffisante sur  $a$  et  $b$  pour que  $A$  appartienne à  $\mathcal{C}$ .

5. Pour chacune des deux matrices suivantes, indiquer si elle appartient à  $\mathcal{C}$  :  $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ,  $\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ .

6. Soit  $A$  une matrice carrée d'ordre 2 appartenant à  $\mathcal{C}$  et soit  $P$  une matrice inversible d'ordre 2, d'inverse  $P^{-1}$ .

On pose :  $D = P^{-1}AP$ . Montrer que  $D$  appartient à  $\mathcal{C}$ .

### Exercice sans préparation T 12

Soit  $X$  une variable aléatoire à densité dont une densité  $f$  est donnée par :  $f(x) = \begin{cases} x e^{-x} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$ .

Déterminer la fonction de répartition  $F$  de  $X$ .

### Exercice principal T 13

1. Question de cours : Définition d'une fonction convexe.

Soit  $f$  la fonction définie sur l'intervalle  $]0, +\infty[$ , à valeurs réelles, telle que :  $f(x) = \frac{1}{2}\left(x + \frac{1}{x}\right)$ .

2.a) Dresser le tableau de variation de la fonction  $f$ .

b) Étudier la convexité de la fonction  $f$ .

c) Tracer la courbe représentative de  $f$  dans le plan rapporté à un repère orthonormé. On précisera les branches infinies de cette courbe.

3. Soit  $(u_n)_{n \geq 0}$  la suite réelle définie par :  $u_0 > 1$  et pour tout entier  $n \geq 1$ ,  $u_{n+1} = \frac{1}{2}\left(u_n + \frac{1}{u_n}\right)$ .

a) Montrer que pour tout entier naturel  $n$ , on a  $u_n \geq 1$ .

b) Étudier la monotonie de la suite  $(u_n)_{n \geq 0}$ .

c) Montrer que la suite  $(u_n)_{n \geq 0}$  est convergente et déterminer sa limite.

### Exercice sans préparation T 13

Une entreprise fabrique des pièces mécaniques à l'aide de deux machines  $A$  et  $B$ .

La machine  $A$  fabrique 20% des pièces et la machine  $B$  fabrique 80% des pièces. La proportion de pièces défectueuses fabriquées par  $A$  est de 5% et par  $B$  de 2%.

On effectue des tirages au hasard avec remise d'une pièce dans l'ensemble de la fabrication.

1. Calculer la probabilité de tirer une pièce défectueuse.

2. À l'issue d'un certain tirage, la pièce tirée est défectueuse. Quelle est la probabilité qu'elle soit fabriquée par la machine  $A$  ?

#### 4. SUJETS DE L'OPTION B/L

##### Exercice principal B/L 10

1. Question de cours : Lien entre convergence et convergence absolue d'une intégrale.

2.a) Montrer que pour tout  $p \in \mathbb{N}$ , l'intégrale  $\int_0^{+\infty} x^p e^{-x} dx$  est convergente. On la note  $I_p$ .

b) Exprimer  $I_{p+1}$  en fonction de  $I_p$ ; en déduire la valeur de  $I_p$  en fonction de  $p$ .

3. Établir pour tout  $p \in \mathbb{N}^*$ , la convergence de l'intégrale  $\int_0^{+\infty} \frac{x^p}{e^x - 1} dx$ . On la note  $J_p$ .

4.a) Pour tout  $(p, k) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^*$ , calculer  $\lim_{X \rightarrow +\infty} \int_0^X x^p e^{-kx} dx$ .

b) Justifier pour tout  $x \geq 0$ , l'inégalité :  $e^x - 1 \geq x$ .

c) Montrer que :  $\forall p \in \mathbb{N}^*, \forall A > 0, \forall n \in \mathbb{N}^*, 0 \leq \int_0^A \frac{x^p e^{-nx}}{e^x - 1} dx \leq \frac{(p-1)!}{n^p}$ .

d) Établir la relation :  $\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x > 0, \frac{x^p}{e^x - 1} = x^p \sum_{k=1}^n e^{-kx} + \frac{x^p e^{-nx}}{e^x - 1}$ .

e) En déduire l'encadrement :  $0 \leq J_p - p! \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^{p+1}} \leq \frac{(p-1)!}{n^p}$ .

5. Rappeler pour quelles valeurs de  $p$  la série de terme général  $\frac{1}{k^{p+1}}$  est convergente.

Pour ces valeurs, exprimer  $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^{p+1}}$  en fonction de  $J_p$ .

##### Exercice sans préparation B/L 10

Un jouet fonctionne avec une pile de type  $A$  et deux piles de type  $B$ . Le jouet peut continuer à fonctionner si l'une des piles  $B$  est déchargée. On suppose que les durées de vie des piles sont mutuellement indépendantes et que la durée de vie de chacune d'entre elles suit un loi exponentielle de paramètre  $\lambda > 0$ .

Quelle est la loi de la durée de vie du jouet ?

### Exercice principal B/L 14

1. Question de cours : Propriétés de  $x \mapsto \int_a^x h(t) dt$ , où  $h$  est une fonction à valeurs réelles, continue sur un intervalle  $I$  contenant  $a$ .

Dans tout l'exercice,  $f$  est une fonction dérivable sur  $[0, 1]$  et  $\varphi$  la fonction définie sur  $[0, 1]$  par :

$$\varphi(x) = \int_0^1 tf(xt) dt. \quad (1)$$

2.a) Montrer que  $\varphi$  est continue et dérivable sur  $[0, 1]$ . On note  $\varphi'$  la dérivée de  $\varphi$ .

À l'aide du changement de variable  $u = xt$ , exprimer  $\varphi'$  en fonction de  $\varphi$  et de  $f$ .

b) Soit  $G$  la fonction définie sur  $[0, 1]$  par :  $G(x) = \int_0^x uf(u) du$ .

Déterminer un développement limité à l'ordre 2 de  $G$  au voisinage de 0, puis la limite de  $\varphi(x)$  lorsque  $x$  tend vers 0.

La fonction  $\varphi$  est-elle continue en 0 ?

3. Soit  $f$  la fonction définie sur  $[0, 1]$  par :  $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - e^{-x^2}}{x} & \text{si } 0 < x \leq 1 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$ .

a) Montrer que  $f$  est dérivable sur  $[0, 1]$ .

b) On associe à  $f$  la fonction  $\varphi$  définie par la relation (1).

Est-il possible de déterminer un réel  $k$  tel que la fonction  $k\varphi$ , prolongée par 0 sur  $\mathbb{R} \setminus [0, 1]$ , soit une densité de probabilité ?

### Exercice sans préparation B/L 14

Soit  $X$  et  $Y$  deux variables aléatoires indépendantes définies sur un espace probabilisé  $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ . On suppose que  $X$  suit la loi exponentielle de paramètre  $\lambda > 0$  et que la loi de  $Y$  est donnée par :

$$P(Y = 1) = P(Y = 0) = P(Y = -1) = \frac{1}{3}.$$

On pose  $Z = XY$  et on admet que  $Z$  est une variable aléatoire définie sur  $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ .

On note  $F_Z$  la fonction de répartition de  $Z$ .

1. Déterminer pour tout  $x$  réel,  $F_Z(x)$  (on distinguera les trois cas  $x < 0$ ,  $x > 0$  et  $x = 0$ ).

2.a) Donner la valeur de  $P(Z = 0)$ .

b) La variable aléatoire  $Z$  est-elle discrète ? Est-elle à densité ?